

EFFETS SECONDAIRES DES VACCINS

Risque de légers effets secondaires C'est normal !




Scan
pour
traduction


1 Douleur



2 Rougeur ou gonflement



3 Fièvre



4 Disparaît rapidement



EFFETS SECONDAIRES DES VACCINS

Est-ce qu'un vaccin peut me rendre malade ?

Après une vaccination, vous pouvez ressentir de légers effets secondaires. C'est normal et cela signifie que notre corps réagit au vaccin. Le vaccin apprend à notre corps comment reconnaître la maladie et la combattre.

La piqûre liée à l'injection ne rend pas vraiment malade. Par contre, vous pouvez effectivement présenter quelques légers symptômes. C'est ce qu'on appelle les "effets secondaires". Les effets secondaires les plus fréquemment observés sont :

- **Douleur dans le bras** et une **rougeur ou un gonflement** au site d'injection.
- **Fièvre, mal de tête et/ou douleur musculaire.**

Les symptômes sont différents d'un vaccin à l'autre et disparaissent généralement spontanément après 1 ou 2 jours.

Attraper la maladie contre laquelle vous êtes vacciné est souvent beaucoup plus grave que les effets secondaires des vaccins.

Des effets secondaires graves peuvent être observés très occasionnellement. C'est très rare. Les symptômes persistent ou s'aggravent ? Dans ce cas, appelez un médecin.

DEPARTEMENT
ZORG



Après la vaccination, il faut attendre 15 minutes avant de repartir pour s'assurer que tout va bien.