

Nieuwsflash –Juli 2026

Hittegolf in België en Europa

In juni werd België getroffen door een extreme hittegolf met gedurende meerdere dagen zeer hoge maximumtemperaturen (tot 35,5 °C bij het referentiestation van Ukkel) en minimumtemperaturen (tussen 20 en 22 °C), wat een risico vormde voor de gezondheid van de bevolking, met name voor de meest kwetsbare personen. Gezien deze situatie werd door de Risk Assessment Group (RAG) [aanbevolen](#) om over te gaan naar de alarmfase van het “[Nationaal ozon- en hitteplan](#)”. Dit voorstel werd goedgekeurd door de Risk Management Group (RMG) en door het Nationaal Crisiscentrum (NCCN), waardoor de verscherpte preventie- en coördinatiemaatregelen in werking konden treden. De autoriteiten hebben de [communicatie](#) naar het grote publiek en professionals geïntensiveerd en daarbij de beschermingsaanbevelingen in herinnering gebracht (voldoende drinken, inspanningen beperken, kwetsbare personen in de gaten houden, enz.). Ook werd om extra waakzaamheid gevraagd aan de zorgsector, lokale overheden en hulpdiensten, die tijdens de hittegolf onder grote druk stonden. Volgens de [voorlopige \(niet-geconsolideerde\) gegevens](#) van Sciensano van 08/07, was er tussen donderdag 18 juni en woensdag 01 juli sprake van een oversterfte van +47,8 % (1 747 extra sterfgevallen), waarvan 716 extra sterfgevallen bij personen ≥ 85 jaar, 765 bij 65-84 jaar en 280 sterfgevallen bij ≤65 jaar. Dit is de hoogste piek in het aantal dagelijkse sterfgevallen in België sinds de eerste COVID-19-golf. Doorheen de zomer wordt de situatie opgevolgd door alle betrokkenen, u vindt de meest actuele informatie [hier](#).

Invasieve pneumokokkenziekte (IPD) – toename van serotype 12F bij jonge kinderen

Zoals gemeld in de [Flash van mei](#), was IPD verder toegenomen in 2025 (+17% ten opzichte van 2024). In 2025 meldde België een recordaantal gevallen (n=2 479), een stijging van +56% ten opzichte van 2019 (n=1 591). Serotype 12F is blijven toenemen en is nu het meest voorkomende pneumokokken-serotype in alle leeftijdsgroepen (20%); met name bij kinderen van 12-23 maanden, waar het meer dan 40% van de IPD-gevallen uitmaakt. Het aantal 12F-gevallen in deze leeftijdsgroep dat tot op 30 juni 2026 is geregistreerd, heeft het totaal voor 2025 (n=32) al overschreden, met overlijdens bij jonge kinderen in beide jaren (2 in 2025 en 2 in de eerste helft van 2026). Bijzonder zijn 2 uitbraken in kinderdagverblijven in Vlaanderen. Klinisch gezien verschilt de 12F-ziekte niet van andere invasieve pneumokokkeninfecties en lijkt de stam genomisch gezien niet virulenter te zijn. 12F wordt niet gedekt door het PCV13-vaccin dat in de vaccinatieprogramma's van de gemeenschappen voor zuigelingen wordt gebruikt. Het serotype 12F is wel opgenomen in PCV20. PCV 20 wordt sinds 2025 [aanbevolen door de HGR voor kinderen](#). De situatie is beoordeeld door de Risk Assessment Groep ([RAG](#)). Aangezien maatregelen om de overdracht te onderbreken wellicht nodig zijn, moet elke cluster van IPD-gevallen met een duidelijk epidemiologisch verband (bijvoorbeeld die zich binnen enkele maanden in hetzelfde verzorgingstehuis, dezelfde crèche of hetzelfde huishouden voordoen) [worden gemeld](#). Dit laat toe om de nodige maatregelen te nemen zoals verhoogde waakzaamheid, chemoprophylaxe en inhaalvaccinatie.

West-Nijlvirus (WNV) – Begin van het seizoen 2026

Het eerste humane geval van WNV in het seizoen 2026 werd in de week van 27 mei gemeld in Noord-Macedonië. Op 24 juni waren er 3 gevallen gemeld, waarvan 2 in Italië en 1 in Noord-Macedonië. Tot op heden zijn er geen sterfgevallen gemeld en komt de huidige situatie overeen met de vroege fase van het seizoen in voorgaande jaren. Vanuit veterinaire oogpunt zijn er in 2026 5 WNV-uitbraken gemeld in Europa: 1 bij paardachtigen (in Frankrijk) en 4 bij vogels (in Italië). Het ECDC voert elk jaar tijdens het overdrachtsseizoen (van mei tot november) een [versterkte surveillance](#) van WNV uit. Deze surveillance, bij mensen, paardachtigen en vogels, vindt plaats in samenwerking met EFSA in het kader van “One Health”-activiteiten. In [augustus 2025](#) werd het WNV voor het eerst in Vlaams-Brabant gedetecteerd bij wilde kraaiachtigen. Er werd voorlopig geen WNV vastgesteld bij paarden, bij vogels of bij mensen.

Ebola – Uitbraak in de Democratische Republiek Congo (DRC) en Oeganda - Update

In de [Flash van juni](#) berichtten we over een uitbraak van ebola in de DRC en Oeganda, met het bundibugyo-virus. Het aantal zieken is ondertussen verder toegenomen met op [28 juni](#) 1 274 bevestigde gevallen in de DRC, waaronder 360 overlijdens. Ituri is de zwaarst getroffen provincie, met 1 165 bevestigde gevallen in 23 gezondheidszones gevolgd door Noord-Kivu met 106 bevestigde gevallen gemeld in 11 gezondheidszones, en Zuid-Kivu met 3 gevallen in één gezondheidszone. Op 28 juni had Oeganda in totaal 20 bevestigde gevallen gemeld, waaronder 2 sterfgevallen, bij alle gevallen is de besmettingsketen bekend en houdt deze verband met de DRC. Op 19 mei werd een arts afkomstig uit de [Verenigde Staten](#) gerepatriëerd vanuit de DRC naar Duitsland met een ebolavirus-infectie en op 24 juni werd ook door [Frankrijk](#) een ebolavirus-infectie gemeld bij een arts die terugkwam van een humanitaire missie in de DRC. In België werd door de RAG een [risk assessment](#) uitgevoerd, het risico op infectie voor Belgen die leven of reizen in de getroffen regio's wordt als laag ingeschat, en het risico voor de algemene Belgische bevolking als zeer laag. Ook het ECDC schat de kans op infectie voor mensen in Europa nog steeds als erg laag in. Meer informatie kan gevonden worden in de [ebolaprocedure](#) of in de [richtlijn van Departement Zorg](#). Elk vermoedelijk geval van ebola moet ook onmiddellijk [gemeld worden](#), zodat - na risico-inschatting - veilig transport van een waarschijnlijk geval naar een HLIU (Universitair Ziekenhuis, Antwerpen of Hôpital St Pierre, Brussel) kan worden georganiseerd.

Dermatophilus congolensis – Clusters in Europa

Sinds eind 2025 werden in verschillende landen in Europa (Frankrijk, Duitsland, Spanje en Zweden) [clusters van infecties met Dermatophilus congolensis](#) vastgesteld. Op 22 juni 2026 waren reeds 70 gevallen gerapporteerd in Europa – bijna uitsluitend onder mannen die seks hebben met mannen (MSM) na blootstelling in seks-positieve sauna's. De warme en vochtige omgeving van dergelijke locaties kan de verspreiding van de bacterie faciliteren. *D. congolensis* is een Gram-positieve bacterie die vooral bekend staat als veroorzaker van huidinfecties bij dieren. Humane infecties zijn zeldzaam en werden historisch vooral in verband gebracht met contact met besmette dieren of een besmette omgeving. De recente clusters wijzen echter op transmissie via seksueel en/of nauw huid-op-huidcontact tussen mensen. Bij mensen veroorzaakt de bacterie doorgaans een milde, gelokaliseerde huidinfectie met papels, pustels, korsten of folliculitis. Systemische klachten worden meestal niet gezien. De diagnose kan gesteld worden aan de hand van cultuur van een korst of huidwisser. De gerapporteerde gevallen kenden over het algemeen een mild verloop en herstelden volledig na behandeling met orale en/of lokale antibiotica; in sommige gevallen trad spontane genezing op. Het [ECDC heeft het risico voor de algemene bevolking beoordeeld](#) als zeer laag en voor MSM als laag.