

Nieuwsflash – Oktober 2026

Luchtweginfecties - Epidemiologische update

De epidemiologische situatie van acute luchtweginfecties was eind september in [code groen](#). Volgens het meest recente [wekelijkse bulletin over acute luchtweginfecties](#) van 23 september is er een stijging in het aantal huisarts consultaties voor acute luchtweginfecties (ARI), het aantal bewoners van woonzorgcentra met griepachtige klachten (ILI) en het aantal ziekenhuisopnames voor ernstige acute luchtweginfectie (SARI), maar al deze indicatoren bevinden zich nog op een laag niveau. De pathogeen-specifieke surveillance toont geen merkbare stijging van alle griep en RSV indicatoren. De SARS-CoV-2 indicatoren nemen wel toe, vooral in de afvalwater surveillance waar de concentratie reeds 10 weken toeneemt en op een hoog niveau is. De toename in het aantal huisartsconsultaties voor bevestigde COVID-19, het aantal positieve SARS-CoV-2-tests door het peilnetwerk van laboratoria en het aantal ziekenhuisopnames voor SARI veroorzaakt door SARS-CoV-2 is echter nog beperkt en op basisniveau. Op [Europese niveau](#) stijgt het aantal consultaties voor luchtweginfecties in de eerstelijns en tweedelijnszorg in verschillende landen, maar wel nog steeds op basisniveau. Net zoals in België, zijn in andere Europese landen de griep en RSV indicatoren op basisniveau, en stijgen de SARS-CoV-2 indicatoren.

WNV - Epidemiologische update

Het jaar 2026 wordt gekenmerkt door een sterke circulatie van het [westnijlvirus in Europa](#), met op 23 september reeds 1.569 gerapporteerde autochtone gevallen in 16 landen. Ook in België circuleert het virus nog steeds. Sinds de vorige berichtgeving hierover begin september werden nu ook, zoals verwacht, humane infecties met het virus vastgesteld. Tot en met 30 september waren er in totaal 13 gemelde gevallen van westnijlkoorts in Vlaanderen (in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen) en één in Brussel. Daarnaast werd er ook een infectie vastgesteld bij een inwoner van Italië, die vermoedelijk besmet werd met het virus tijdens een verblijf in Brussel. In andere Belgische provincies (Oost-Vlaanderen, Limburg, Waals-Brabant, Namen en Henegouwen) werd het virus vastgesteld bij vogels en/of paarden. Omdat de surveillance niet volledig sluitend is kan circulatie elders onopgemerkt gebleven zijn, maar de belangrijkste getroffen gebieden lijken vooral op de as tussen Brussel en Antwerpen te liggen. Modelleringsstudies zullen mee kunnen uitmaken of hiervoor ecologische verklaringen zijn. In lijn met de aanbevolen maatregelen in het [nationale plan voor surveillance, preventie en bestrijding van het WNV in België](#), werd de communicatie over muggenpreventie en de ziekte versterkt in de getroffen gebieden naar artsen en de bevolking.

Dengue en chikungunya – Epidemiologische situatie in Europa

Tot en met 23 september 2026 hebben Frankrijk en Italië autochtone gevallen van dengue en chikungunya gemeld. In [Frankrijk](#) zijn zes gevallen van dengue geregistreerd, verdeeld over vier clusters in Occitanie, Nouvelle-Aquitaine en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Geen van deze cluster is momenteel nog actief. Daarnaast zijn er 90 gevallen van chikungunya geregistreerd in 13 clusters (1 tot 30 gevallen per cluster) in Occitanie, Nouvelle-Aquitaine en Île-de-France. In [Italië](#) zijn 47 gevallen van dengue geregistreerd verdeeld over zeven clusters in de regio's Florence en Napels. Deze clusters zijn momenteel allemaal actief. Daarnaast is in Rome één geval van chikungunya gemeld. Zowel in Frankrijk als in Italië lopen onderzoeken en worden preventie- en bestrijdingsmaatregelen genomen voor de verschillende clusters die nog actief zijn. In België zijn er tot hertoe nog geen autochtone gevallen van [dengue](#) of [chikungunya](#) gemeld, maar vestigt de tijgermug zich in [verschillende gemeenten](#).

Buiktyfus - Toename aantal infecties na reis naar Senegal en Guinee

Het [Nationaal Referentiecentrum \(NRC\) voor Salmonella spp.](#) stelt momenteel een toename vast van het aantal tyfoïde salmonellosen bij personen met een recente reisgeschiedenis naar Senegal en Guinee. We vragen daarom om verhoogde waakzaamheid bij patiënten met klachten passend bij [buiktyfus](#) of een andere systemische Salmonella-infectie die recent uit deze landen zijn teruggekeerd. Buiktyfus is [meldingsplichtig](#) zodat tijdig bronopsporing en contactonderzoek kan uitgevoerd worden. Stalen kunnen doorgestuurd worden naar het NRC.

Plasmodium falciparum – Malaria op de luchthaven van Frankfurt

Op 18 september 2026 waren er acht gevallen van *Plasmodium falciparum*-malaria gemeld bij werknemers van de internationale luchthaven van Frankfurt (zes gevallen) en omwonenden. Zes patiënten ontwikkelden symptomen in juli of augustus; twee anderen, die op minder dan 5 km van de luchthaven woonden, begin september. Geen van de gevallen had gereisd naar een gebied waar malaria endemisch is. Drie patiënten zijn overleden. Vermoedelijk gaat het om 'luchthavenmalaria', al kan de betrokkenheid van lokale *Anopheles*-muggen in dit stadium nog niet worden uitgesloten. De Duitse gezondheidsautoriteiten voeren momenteel epidemiologisch onderzoek uit, evenals entomologische monitoring en genetische karakterisering van de parasieten op basis van monsters die bij de patiënten zijn afgenomen, om eventuele verbanden tussen de gevallen en de waarschijnlijke bron van de infectie te verduidelijken. Dergelijke gevallen komen niet onverwacht en komen ook sporadisch voor in België. Sinds 2020 worden er jaarlijks gevallen van 'luchthavenmalaria' of 'koffer-malaria' vastgesteld in België. Het is dan ook belangrijk om huisartsen bewust te maken van deze problematiek en hen aan te moedigen om [malaria](#) als differentiële diagnose te overwegen bij patiënten met passende symptomen, zelfs zonder reisgeschiedenis, vooral tijdens de zomermaanden.

Departement Zorg – Actualisatie richtlijnen meldingsplichtige infectieziekten

De volgende richtlijnen werden geactualiseerd. [Mazelen](#): meer aandacht voor IVIG na blootstelling bij kwetsbare personen, conform de [HGR](#) / [Westnijlvirus](#): integratie van het beleid volgens het [nationale WNV-plan](#) / [Scabiës](#): integratie van de [WOREL-adviezen](#), in het bijzonder met betrekking tot de behandeling / [STEC](#): versoepeling van het weringsbeleid, bij kinderen < 6 jaar die naar een collectiviteit gaan, is alleen bij ernstige kliniek nog één opvolgstaal nodig / [Buiktyfus](#): verduidelijking dat de javavariant niet meldingsplichtig is / [Shigellose](#): verduidelijking dat alle positieve PCR-resultaten voor Shigella/EIEC meldingsplichtig zijn / [Niet-tyfoïdale salmonellose](#): actualisatie met input van het NRC. Details over deze aanpassingen staan op het titelblad van elke richtlijn.